



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
 Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235
 Τηλ. : 2510 600431, 2510 245684
 Fax: 2510 600430
 E mail : dpyrgiotou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

No 12/20 -04-2022

Πληροφορίες : Δ. Πυργιώτου, Θ. Μαρκόπουλος, Θ. Γεωργιάδου.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Ευρύτομο Αμυγδαλιάς – Ν. Σερρών



Κλωβός παρακολούθησης του Ευρύτομου στο Ορφάνι Καβάλας

(Π.Κ.Π.Φ.Π.&Φ.Ε.-ΚΑΒΑΛΑΣ)



Από επιτόπιους ελέγχους και παρατηρήσεις που έγιναν στο δίκτυο των κλωβών με προσβεβλημένα αμύγδαλα που έχει εγκαταστήσει η υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η έξοδος και η έναρξη της πτήσης του εντόμου ευρύτομο (*Eurytoma amygdali*) **ΜΟΝΟ** σε περιοχές του Ν. Σερρών. Ενώ παρά των επιστάμενο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η έξοδος του εντόμου

και η έναρξη της πτήσης σε ΚΑΜΙΑ περιοχή του Ν. Καβάλας (ούτε καν στις παραθαλάσσιες περιοχές). Η διαμορφωθείσα κατάσταση, όσον αφορά το έντομο, αποδίδεται σε παράγοντες που έχουν να κάνουν με το μικροκλίμα των περιοχών και τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που διαμορφώνονται.

Γενικότερα, επισημαίνεται ότι η έξοδος του εντόμου και η δραστηριότητά του διαρκεί, συνήθως, 20 - 25 ημέρες ή και περισσότερο. Το ευρύτομο θεωρείται από του σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπισή του μπορεί



να επιφέρει σημαντική οικονομική ζημιά στους αμυγδαλοπαραγωγούς.

Στα πλαίσια αυτά συνιστάται στους παραγωγούς να ψεκάσουν τις επόμενες ημέρες στις περιοχές του Ν. Σερρών με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπιση του εντόμου. Τονίζεται ότι οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται με τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες κατά τις θερμές ώρες της ημέρας με ηλιοφάνεια, οπότε παρατηρούνται μεγαλύτεροι πληθυσμοί ενηλίκων ατόμων σε δραστηριότητα. Ενώ συνιστάται επανάληψη ανά 7-8 ημέρες, μέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου. **Επισημαίνεται ότι στις πιο θερμές και πρώιμες περιοχές ο ψεκασμός πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα ενώ στις υπόλοιπες (πιο όψιμες) περιοχές θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά από 3-5 ημέρες.**

Συνιστάται να μην ψεκάσουμε τις ημέρες με συννεφιά γιατί τότε δεν καταγράφεται σημαντική δραστηριότητα του εντόμου. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ποικιλία «Τέξας» που θεωρείται ότι είναι πιο ευαίσθητη στην προσβολή του ευρύτομου της αμυγδαλιάς και μπορεί να προκαλέσει πρόωρη καρπόπτωση.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι εξειδικευμένες οδηγίες που χορηγούνται στα πλαίσια της συνταγογράφησης και οπωσδήποτε η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή.

- Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευτούν για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. <https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>

- το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων



- Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpyrgiotou@minagric.gr, thmarkopoulos@minagric.gr, thgeorgiadou@minagric.gr.
- Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής **i-agric** του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου